

Activo en el programa STAR de Texas desde: 03/01/2012

Áreas de servicio: Travis

Número de miembros (diciembre 2015)

| Número de miembros: 17,332 | | |
|----------------------------|-------|-------|
| Mujeres | 9,200 | 53.1% |
| Hombres | 8,132 | 46.9% |


Edad

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 0 - 9 años | 9,795 | 56.5% |
| 10 - 20 años | 6,033 | 34.8% |
| 21+ años o más | 1,504 | 8.7% |

Indicadores de rendimiento del HHS - medidas AHRQ PDI y PQI (por 100,000 miembros-meses), 2015⁴

| | | MCO | Estándar HHS (2015) |
|-----|--|-------|---------------------|
| PDI | Asma | 11.27 | 8 |
| | Diabetes a corto plazo | 3.74 | 1 |
| | Gastroenteritis | 6.74 | 3 |
| | Apéndice perforado (por 100 admisiones appendicitis) | LD | 30 |
| | Infección del tracto urinario | 3.37 | 2 |
| PQI | Diabetes a corto plazo | 7.86 | 11 |
| | Diabetes a largo plazo | 7.86 | 6 |
| | EPOC/asma en adultos | 0.00 | 109 |
| | Bajo peso al nacer (por 100 nacimientos vivos) | 5.23 | 4 |
| | Neumonía bacteriana | 3.93 | 6 |
| | Infección del tracto urinario | 7.86 | 10 |

HEDIS® Atención de rutina para niños primeros 15 meses



Indicadores de rendimiento del HHS - información administrativa, 2015³

| | MCO | Estándar HHS (2015) |
|---|-------|---------------------|
| HEDIS® % de niños con acceso a PCP (12 a 24 meses de edad) | 97.3% | 99% |
| HEDIS® % de niños con acceso a PCP (25 meses a 6 años de edad) | 88.8% | 95% |
| HEDIS® % de niños con acceso a PCP (7 a 11 años de edad) | 94.1% | 96% |
| HEDIS® % de niños con acceso a PCP (12 a 19 años de edad) | 94.1% | 95% |
| HEDIS® Atención de rutina para niños primeros 15 meses | 61.2% | 69% |
| HEDIS® Atención de rutina para niños - 3 a 6 años | 75.7% | 83% |
| HEDIS® Atención de rutina para adolescentes | 64.1% | 65% |
| HEDIS® Estado de inmunización infantil - combinación 4 | 69.6% | 76% |
| HEDIS® Estado de inmunización infantil - combinación 10 | 41.1% | — |
| HEDIS® Detección de cáncer cervical | 57.6% | 70% |
| HEDIS® Cuidados prenatales | 88.8% | 89% |
| HEDIS® Cuidados después del parto | 72.0% | 66% |
| HEDIS® Detección de clamidia en mujeres | 41.3% | 58% |
| HEDIS® Percentil documentado de BMI en niños y adolescentes | 66.7% | 52% |
| HEDIS® Asesoría en nutrición para niños y adolescentes | 63.7% | 65% |
| HEDIS® Asesoría en actividad física para niños y adolescentes | 48.4% | 49% |
| HEDIS® Administración de medicamentos para personas con asma - tasa de observancia del 75% | 16.0% | 29% |
| HEDIS® Proporción de medicamentos del asma >50% | 72.7% | 82% |
| HEDIS® Tratamiento adecuado para niños con infección de las vías respiratorias superiores | 95.9% | 87% |
| HEDIS® Evitación de tratamiento antibiótico en adultos con bronquitis aguda | LD | 24% |
| HEDIS® Pruebas adecuadas para niños con faringitis | 81.9% | 68% |
| HEDIS® Seguimiento 7 días después de una hospitalización por razones de salud mental | 36.8% | 44% |
| HEDIS® Antidepresivos - Agudo | 60.0% | 53% |
| HEDIS® Seguimiento para inicio del tratamiento farmacológico para trastorno por déficit de atención | 40.0% | 47% |

Indicadores de rendimiento del HHS - Encuestas, 2015 y 2016²

| | MCO | Estándar HHS (Adulto, 2016) | MCO | Estándar HHS (Niño, 2015) |
|---|-------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| Acceso adecuado a atención de emergencia | 72.7% | 68% | 73.9% | 83% |
| Acceso adecuado a citas con especialistas | 32.5% | 52% | 51.4% | 53% |
| Acceso adecuado a atención de rutina | 51.3% | 59% | 75.9% | 73% |
| Acceso a terapia o tratamientos de salud mental | LD | 53% | LD | 54% |
| Calificación a un médico de cabecera de 9 o 10 | 63.1% | 67% | 81.4% | 77% |
| Calificación al plan médico de 9 o 10 | 39.5% | 64% | 84.1% | 81% |
| Buena comunicación con el médico | 75.0% | 77% | 81.9% | 80% |
| Asesoría para dejar de fumar | 28.3% | 43% | N/A | — |